UTSouthwestern
Harold C. Simmons
Comprehensive Cancer Center
Radiation Oncology

Preparación para endoscopía de recto

_____ tiene una endoscopía de recto con/sin biopsia programada con el Dr. _____ en William P. Clements Jr. University Hospital Radiation Oncology Building, en 2280 Inwood Road, Dallas, TX 75390, el _____. Hora de registro para el procedimiento: _____.

Dos horas antes del procedimiento, póngase dos enemas Fleet®. Los puede comprar en prácticamente cualquier farmacia sin receta. Para hacerse el enema, acuéstese de costado y flexione las rodillas. Quite la tapa de la punta del aplicador e introduzca la punta con suavidad en el recto. Para obtener mejores resultados, quédese acostado hasta que sienta la necesidad de defecar; esto debería suceder en 2 a 15 minutos. Si no defeca, avísele al enfermero apenas llegue para su procedimiento.

- Llegue puntualmente a la hora del registro para tener tiempo para prepararse para el procedimiento.
- Puede tomar todos sus medicamentos según las indicaciones. Avísele al enfermero si está tomando anticoagulantes.
- NO es necesario que esté en ayunas.
- No se necesitan antibióticos.
- Si tiene dolor cuando defeca, tome los medicamentos que le recomendaron para aliviar el dolor una hora antes del procedimiento. Le pondrán una vía intravenosa (IV) para administrarle más medicamentos para el dolor si fuese necesario.
- Si toma medicamentos para el dolor, asegúrese de tener un conductor que lo lleve a su casa.
- Usted estará despierto durante el procedimiento, que dura aproximadamente 30 minutos.
- Asegúrese de traer una muestra de heces si le dieron un kit.

Si tiene alguna pregunta o preocupación, llame al 214-645-8525.

© 2022 UT Southwestern Medical Center 3.15.22