

Cáncer de Vulva

Esta información le ayudará a usted y a su cuidador a prepararse para el tratamiento. El cáncer de vulva es un cáncer que se produce en la superficie externa de los genitales femeninos conocida como vulva.

¿Qué se puede esperar?

Recibirá radioterapia externa, un tratamiento no invasivo. También puede recibir quimioterapia semanal para aumentar el efecto de la radiación.

Efectos secundarios

Puede desarrollar efectos secundarios 2 a 3 semanas después de comenzar la radioterapia.

- La fatiga es común durante el tratamiento
- Irritación/sensibilidad de la piel, enrojecimiento, hinchazón, ampollas y descamación (como una quemadura por el sol)
- Dolor por la ruptura de la piel, que puede ser grave
- Llagas o infecciones en la piel
- Náuseas/vómitos
- Problemas de la vejiga y el intestino, como
 - Disuria (ardor al orinar)
 - Dificultad para orinar
 - Deposiciones frecuentes
 - Diarrea
 - Sangre en las heces
 - Flujo vaginal
 - Estrechamiento de la vagina
- Inflamación (linfedema) de los ganglios o vasos linfáticos
- Un recuento sanguíneo bajo!

- Cambios sexuales, incluyendo dolor al tener relaciones sexuales o sangrado después de las mismas debido a cambios en la vagina
- Dejar de tener la menstruación (menopausia prematura) debido a daño en los ovarios
- No puede quedar embarazada (infertilidad) debido a daños en los ovarios

Por favor, comente con su médico, enfermera o terapeuta los efectos secundarios o, mientras está en su tratamiento

Cuidado de la Piel

Báñese y dúchese con un jabón suave sin perfume, como Dove[®], Ivory, o Cetaphil[®].

- **NO** use una toalla, un paño o un cepillo cuando se duche
- **No** se bañe en la tina; utilice una ducha o una ducha de mano si es posible
- Seque la piel con una toalla suave o déjela secar al aire libre
- **NO** utilice cremas hidratantes 4 horas antes a la radioterapia
- Intente enjuagarse con una ducha de mano después de cada defecación para evitar la irritación de la piel por limpiarse demasiado
- Evite las temperaturas extremas en la zona tratada (jacuzzis, almohadillas térmicas, bolsas de hielo, etc.)
- Evite broncearse o quemarse la piel durante y después del tratamiento!
- Una vitamina diaria está bien durante el tratamiento! **NO** tome otras vitaminas ni ningún otro suplemento, tanto nutricional como a base de hierbas, sin consultar a su médico

Cuidado de la ruptura de la piel

- Una vez que se produzca el desprendimiento de la piel (descamación), comience a utilizar los baños de Domeboro (revise el folleto proporcionado).
- Tendrá que empezar a tomar píldoras antimicóticas por vía oral la segunda semana.

- Si la ruptura de la piel es muy dolorosa, necesitará analgésicos (medicamentos para el dolor), gel de lidocaína o baños de asiento.
- También puede necesitar la crema Silvadene, que le recetará su médico

Precauciones

- Informe a su médico, enfermera o terapeuta de cualquier cambio en la piel.
- Las almohadillas térmicas o el agua muy caliente pueden causar dolor o irritación de la piel en la zona de tratamiento.
- Se debe evitar el uso de jacuzzis o saunas mientras se recibe la radiación, así como 6 semanas después del tratamiento
- **NO** utilice productos con alcohol, incluidas almohadillas con alcohol, en la piel de las zonas tratadas
- **NO** use maquillaje, perfumes ni polvos en la zona tratada

Comuníquese con su equipo médico de inmediato, si tiene:

- Más de 5 deposiciones líquidas en un período de 24 horas
- Una hemorragia inusual
- Temperatura de 100.5 grados F o más
- Escalofríos

Comuníquese con nosotros

Para cualquier pregunta o inquietud, por favor comuníquese con la clínica de Radiación Oncológica al 214-645-8525. Para preguntas no urgentes, puede comunicarse por MyChart.